CS

Pohárek pro kojence

Použití:

Baby cup představuje pomůcku určenou pro podávání mateřského mléka, léků nebo malých příkrmů. Je vhodný rovněž pro děti, které nemohou být kojeny, děti slabé či předčasně narozené nebo děti s neurologickými poruchami.

Čištění a údržba

Důležité
- Pro všechny následující popsané postupy čištění používejte výhradně kvalitní pitnou vodu.
- Kelímek čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
- V případě poškození nebo opotřebení kelímek vyměňte.

Čištění
Tyto pokyny k čištění a obecná doporučení lze individuálně upravit podle čisticích předpisů a praxe dané nemocnice.

Důležité
Doporučujeme pro každé dítě vyhradit jeden kelímek. Před prvním použitím musí být kelímek vysterilizován. Po každém použití nebo nejpozději při každém předání dalšímu dítěti, musí být pohárek vyčištěn a vysterilizován (například ve sterilizátoru). Použití kelímku pro více dětí bez náležité sterilizace představuje zdravotní riziko (například riziko křížové kontaminace) a dochází k zániku záruky.

Čištění
Kelímek umyjte v teplé jarové vodě, poté důkladně opláchněte v čisté vodě.

Dezinfekce
Dezinfekci je možné provádět varem, v myčce nádobí nebo v parním sterilizátoru při minimální teplotě 93°C.

Sterilizace
Před sterilizací kelímek pohledem zkontrolujte, zda je čistý a neporušený. Kelímek sterilizujte 3 (nebo 18) minut ve sterilizátoru při teplotě 134 °C nebo 15–20 minut při 125 °C. Aby se předešlo poškození, kelímky nevkládejte do sebe ani je nevystavujte vnějšímu tlaku. Kelímek lze případně sterilizovat i etylenoxidem.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Před prvním použitím požádejte o radu lékaře či laktační asistentku. Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu mléka (riziko popálení). Mléko neohřívejte v mikrovlnné troubě, může dojít k nerovnoměrnému ohřátí a následnému popálení dítěte.

Materiál: polypropylen
Likvidace: Dodržujte místní předpisy

CE značka dle 93/42/EEC

CE 0123

Přeprava/skladování

CS

Pohárek pro kojence

Použití:

Baby cup představuje pomůcku určenou pro podávání mateřského mléka, léků nebo malých příkrmů. Je vhodný rovněž pro děti, které nemohou být kojeny, děti slabé či předčasně narozené nebo děti s neurologickými poruchami.

Čištění a údržba

Důležité
- Pro všechny následující popsané postupy čištění používejte výhradně kvalitní pitnou vodu.
- Kelímek čistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků mléka a následnému množení bakterií.
- V případě poškození nebo opotřebení kelímek vyměňte.

Čištění
Tyto pokyny k čištění a obecná doporučení lze individuálně upravit podle čisticích předpisů a praxe dané nemocnice.

Důležité
Doporučujeme pro každé dítě vyhradit jeden kelímek. Před prvním použitím musí být kelímek vysterilizován. Po každém použití nebo nejpozději při každém předání dalšímu dítěti, musí být pohárek vyčištěn a vysterilizován (například ve sterilizátoru). Použití kelímku pro více dětí bez náležité sterilizace představuje zdravotní riziko (například riziko křížové kontaminace) a dochází k zániku záruky.

Čištění
Kelímek umyjte v teplé jarové vodě, poté důkladně opláchněte v čisté vodě.

Dezinfekce
Dezinfekci je možné provádět varem, v myčce nádobí nebo v parním sterilizátoru při minimální teplotě 93°C.

Sterilizace
Před sterilizací kelímek pohledem zkontrolujte, zda je čistý a neporušený. Kelímek sterilizujte 3 (nebo 18) minut ve sterilizátoru při teplotě 134 °C nebo 15–20 minut při 125 °C. Aby se předešlo poškození, kelímky nevkládejte do sebe ani je nevystavujte vnějšímu tlaku. Kelímek lze případně sterilizovat i etylenoxidem.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte
Před prvním použitím požádejte o radu lékaře či laktační asistentku. Před krmením dítěte vždy zkontrolujte teplotu mléka (riziko popálení). Mléko neohřívejte v mikrovlnné troubě, může dojít k nerovnoměrnému ohřátí a následnému popálení dítěte.

Materiál: polypropylen
Likvidace: Dodržujte místní předpisy

CE značka dle 93/42/EEC

CE 0123

Přeprava/skladování