

Složení/Zloženie: MLÉČNÁ SYROVÁTKA*/MLIEČNÁ SRVÁTKA*, voda, odtučnené MLÉKO*/odtúčené MLIEKO*, SMETANA*/SMOTANA*, LAKTOZA* (z MLEKA*/MLIEKA*) rostlinné/rastlinné oleje* (slunečnicový/slnecnicový), řepkový/repkový*) galaktooligosacharidy* z LAKTOZY (z MLEKA*/MLIEKA*), emulgátor lecitín*/lecitín*, citronan vápenatý, RYBI olej†, chlorid draselný, vápenaté soli kyseliny ortofosforečné/ ortofosforečné, draselné soli kyseliny citrónové/citronovej, L-askorbát sodný + askorbyl-L-palmitan (vitamin C), L-fenylalanin/ fenylalanin, chlorid sodný, hydroxid hořečnatý/horečnatý, L-tryptofan/tryptofán, síran železnatý, síran zinečnatý/zinočnatý, citronan sodný, nikotinamid/nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl acetat (vitamin E), síran mědnatý/mednatý, D-pantothénát vápenatý, retinyl acetat (vitamin A), hydroxid draselný, thiamin/thiamin hydrochlorid (vitamin B1), hydrochlorid pyridoxinu/pyridoxin (vitamin B6), jodičnan draselný, kyselina listová, seleničitan sodný, síran manganatý, fytonenadiol (vitamin K), cholekaliferol (vitamin D), D-biotin/biotin, kyanokobalamin/kyanokobalamin (vitamin B12). *LCP (omega 3 MK) = nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem/nenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom

* z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva (DE-OKO-001 **Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ**)

Návod k přípravě: K **přímé spotřebě** po **tepelné úpravě**. Víčko musí být před prvním použitím nepoškozené, jinak nepoužívejte. Během skladování může dojít k mírnému oddělení složek, lahvičku protřepte. Neohřívejte v mikrovlnce. Nechraňte mléko uchovávejte v uzavřené lahvi v lednici a spotřebujte do 24 hodin po otevření.

Ohřete ve vodní lázni (40 °C). Dvěřte vyhovující teplotu mléka. Ihned krmte. Zbytky mléka již znovu nepodávejte! Nesprávná příprava a uchování ohřátého mléka dlouhou dobu může ohrozit dítě, např. růstem bakterií. Láhev a její součásti vymyjte. **Návod na přípravu:** K **přímé spotřebě** po **tepelné úpravě**. Víčko musí být před prvním použitím nepoškozené, jinak nepoužívejte. Počas skladovania muža dojst k miernemu oddeleniu zložiek, fľaštičku pretrepte. Neohrievajte v mikrovlnke. Neohrievajte mlieko uchovajte v uzavretej fľaši v chladničke a spotrebujte do 24 hodín po otvorení. **Ohrejte vo vodnom kúpeli (40 °C).** Dvete vyhovujúcej teplotu mlieka. Ihned krmte. Zvyšky mlieka už znova nepodávajte! Nesprávna príprava a uchovávanie pripravěného mlieka dlhú dobu môže ohroziť dieťa, napr. rastom baktérií. Fľašu a jej súčasťi vymyte.

Použití/Použitie: v období přikrmování – v návaznosti na kojení nebo na jakoukoliv mléčnou výživu, pokud je Vaše dítě již přikrmováno.

v období prikrmovania – v nadväznosti na dojčenie alebo na akúkoľvek dojčenskú výživu, pokiaľ je už Vaše dieťa prikrmované.

Věk/Vek	Množství mléka/Množstvo mlieka ml
od ukončeného 6. měsíce/mesiaca	170-200

Kojenci potřebují cca 5 jídel/den. 1 nově přidaný nemléčný příkrm nahrazuje 1 mléčnou porci. / Dojčatá potrebujú cca 5 jedál/ deň. 1 novo pridaný nemliečny príkrm nahraduje 1 mléčnú porciu.

HiPP 2 BIO Combiotik Pokračovací mléčná kojenecká/Následná mliečna dojčenská výživa

OD UKONČENÉHO 6. MĚSÍCE/MESIACA

Výška plnění je technicky podmíněná/výška plnenia je technicky podmienená. Skladujte v suchu při/pri max 25 °C. Minimální trvanlivost/Minimálna trvanlivosť do: viz víčko/víď uzáver.

Výživové údaje/100 ml: Energetická hodnota/Energie 285/68 kJ / kcal, Tuky 3,7 g, z toho = nasycené/nasýtené MK 1,4 g, = mono-nenasycené/nenasýtené MK 1,8 g, = poly-nenasycené/nenasýtené MK 0,5 g, z toho kyselina linolová (omega 6 MK) = 0,42 g, kyselina linolenová/linolenová (omega 3 MK) = 0,06 g, = DHA kyselina dokozahexaenová/dokosahexaenová 13,6 mg, Sacharidy 7,2 g, z toho = cukry 7,2 g, = laktoza 7,0 g, Vláknina 0,5 g, Bílkoviny/Bielkoviny 1,3 g, sodík 20 mg, draslík 84 mg, chlorid 52 mg, vápník/vápník 70 mg, fosfor 40 mg, hořčík/horčík 6,3 mg, železo 1,0 mg (13 %), zinek/zinok 0,50 mg, měď/med 0,054 mg, mangan/mangan 0,0070 mg, fluoridy <0,0050 mg, selen/selén 3,9 µg, jód 15 µg, Vitamin A 56 µg (14 %), Vitamin D 1,6 µg (23 %), Vitamin E 0,80 mg, Vitamin K 3,1 µg, Vitamin C 10,0 mg (27 %), Vitamin B1 0,040 mg, Vitamin B2 0,14 mg, niacin/niacín 0,53 mg, Vitamin B6 0,040 mg, kyselina listová 10 µg, Vitamin B12 0,10 µg, Biotin/Biotin 1,6 µg, kyselina pantothenová/pantotenová 0,35 mg.

Hodnoty podléhají výkyvům typické pro přírodní suroviny/podliehajú výkyvom bežných pre prírodné suroviny. Balení v ochranné atmosféře/ochranné atmosfére. MK = mastné kyseliny, *referenčního příjmu/referenčního příjmu

Důležitá upozornění - Dôležité upozornenia: Vylučné kojení je v prvních měsících nejlepší. Nevhodné jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců. Určeno pro výživu od ukončeného 6. měsíce, má být součástí smíšené stravy. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o **přikrmování** a jakékoliv výjimky by mělo být přijímáno jen na doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy. Farmacie nebo péče o matku a dítě, a na individuálních potřebách. Jako mateřské mléko obsahují kojenecké výživy sacharidy, které mohou způsobit zubní kaz. Nenechávejte dítě pít z láhve po dlouhou dobu, naučte ho co nejdříve pít z hrnečku. Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu. / Vylučné dojenie je v prvých mesiacoch najlepšie. Nemá sa používať ako náhrada materského mlieka bežom prvých šiestich mesiacov. Určeno pre výživu od ukončeného 6. mesiaca a má byť súčasťou zmiešanej stravy. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, a akékoľvek výnimky, by malo byť prijímané len na odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti na individuálnych potrebách. Ako materské mlieko obsahujú dojčenské výživy sacharidy, ktoré môžu spôsobiť zubný kaz. Nenechávajte dieťa dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života.

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, hipp.cz, hipp.sk

Balení: Německo/Nemecko.

e 200 ml

2225

